УДК 517.5

В. В. Билет (Институт прикладной математики и механики НАН Украины, г. Славянск)
Р. Р. Салимов (Институт математики НАН Украины, г. Киев)

В. В. Білет (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, м. Слов'янськ)
Р. Р. Салімов (Інститут математики НАН України, м. Київ)

V. V. Bilet (Institute of Applied Mathematics and Mechanics of NASU, Sloviansk)
R. R. Salimov (Institute of Mathematics of NASU, Kyiv)

arXiv:1604.07618v1 [math.CV] 26 Apr 2016

Оценка площади образа круга для классов Соболева

Для регулярных гомеоморфизмов класса Соболева $W^{1,1}_{\rm loc}$, обладающих N-свойством Лузина, установлена оценка площади образа круга в терминах угловой дилатации. Как следствие, получен аналог известной леммы Икома-Шварца для таких отображений.

Ключевые слова: *угловая дилатация, изопериметрическое неравенство, класс Соболева*

Оцінка площі образу кола для класів Соболєва

Для регулярних гомеоморфізмів класу Соболєва $W^{1,1}_{\rm loc}$, які задовольняють N-властивості Лузіна, встановлено оцінку площі образу кола в термінах кутової дилатації. Як наслідок, отримано аналог відомої леми Ікома-Шварца для таких відображень.

Ключові слова: *кутова дилатація, ізопериметрична нерівність, клас Соболєва*

The estimation of the area of a disk image for Sobolev classes

For regular homeomorphisms of Sobolev class $W^{1,1}_{\rm loc}$ having the Luzin N-property, it is established the estimation of the area of a disk image in terms of an angular dilatation. As a corollary, the analog of the well-known Ikoma-Schwartz lemma for such mappings is obtained.

Keywords: *angular dilatation, isoperimetric inequality, Sobolev class*

1. Введение. В данной статье получены точные оценки искажения площади образа круга при регулярных гомеоморфизмах класса Соболева $W^{1,1}_{\rm loc}$, обладающих N-свойством (Лузина).

Отметим, что впервые оценка площади образа круга при квазиконформных отображениях встречается в монографии Лаврентьева М. А., см. [3]. В монографии [1], см. предложение 3.7, получено уточнение неравенства Лаврентьева в терминах угловой дилатации. Также ранее в работах [5] и [7] верхние оценки искажения площади образа круга были получены методом модулей.

Пусть G – область в комплексной плоскости $\mathbb{C}$, то есть связное, открытое подмножество $\mathbb{C}$. Напомним, что отображение $f : G \to \mathbb{C}$ называется *регулярным в точке* $z_0 \in G$, если в этой точке f имеет полный дифференциал и его Якобиан $J_f = |f_z|^2 - |f_{\bar z}|^2 \neq 0$ (см., например, I. 1.6 в [4]). Гомеоморфизм f класса Соболева $W^{1,1}_{\rm loc}$ называется *регулярным*, если $J_f > 0$ почти всюду (п.в.).

Говорят, что гомеоморфизм $f : G \to \mathbb{C}$ обладает *N-свойством* (Лузина), если для любого множества $E \subset G$ из условия $|E| = 0$ следует, что $|f(E)| = 0$.

2. Вспомогательные результаты.

Обозначим через $L(r)$ длину кривой $f(re^{i\theta})$, $0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$, и через $S(r) = |f(B_r)|$ – площадь $f(B_r)$. Везде далее полагаем

$$B_r = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leqslant r\}, \quad \mathbb{B} = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leqslant 1\}.$$

Лемма 1. *Пусть $f : \mathbb{B} \to \mathbb{B}$ — регулярный гомеоморфизм класса Соболева $W^{1,1}_{\rm loc}$, обладающий N-свойством. Тогда при $p \geqslant 2$*

$$L^p(r) \leqslant \delta_p(r) S'(r) \tag{1}$$

для п.в. $r \in [0,1]$, где

$$\delta_p(r) = \left(\int\limits_{\gamma_r} D_p^{\frac{1}{p-1}}(z)\, |dz| \right)^{p-1}, \quad \gamma_r = \{z \in \mathbb{C} : |z| = r\}. \tag{2}$$

Доказательство. Для п.в. $r \in [0,1]$, имеем

$$L(r) = \int\limits_0^{2\pi} |f_\theta(re^{i\theta})|\, d\theta = \int\limits_0^{2\pi} D_p^{\frac{1}{p}}(re^{i\theta})\, J_f^{\frac{1}{p}}(re^{i\theta})\, r\, d\theta, \tag{3}$$

где

$$D_p(re^{i\theta}) = \frac{|f_\theta(re^{i\theta})|^p}{r^p J_f(re^{i\theta})} - \tag{4}$$

p-угловая дилатация и J_f обозначает Якобиан отображения f.

Применяя неравенство Гельдера, имеем

$$L(r) \leqslant \left(\int\limits_0^{2\pi} J_f(re^{i\theta})\, r\, d\theta \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int\limits_0^{2\pi} D_p^{\frac{1}{p-1}}(re^{i\theta})\, r\, d\theta \right)^{\frac{p-1}{p}} \tag{5}$$

для п.в. $r \in [0,1]$. Используя тот факт, что

$$S'(r) \,=\, \int\limits_0^{2\pi} J_f(re^{i\theta})\, r\, d\theta, \tag{6}$$

получаем

$$L^p(r) \leqslant \delta_p(r) S'(r) \tag{7}$$

для п.в. $r \in [0,1]$. Лемма 1 доказана.

В следующей лемме получено дифференциальное неравенство для функции $S(r)$.

Лемма 2. *Пусть $f : \mathbb{B} \to \mathbb{B}$ — регулярный гомеоморфизм класса Соболева $W^{1,1}_{\mathrm{loc}}$, обладающий N-свойством. Тогда при $p \geqslant 2$*

$$S'(r) \geqslant (4\pi)^{\frac{p}{2}}\, \delta_p^{-1}(r)\, S^{\frac{p}{2}}(r) \tag{8}$$

для п.в. $r \in [0,1]$, где $\delta_p(r)$ определено равенством (2).

Доказательство. Из неравенства (1) следует, что для п.в. $r \in [0,1]$

$$S'(r) \geqslant \delta_p^{-1}(r)\, L^p(r). \tag{9}$$

Используя, далее, известное изопериметрическое неравенство

$$L^2(r) \geqslant 4\pi S(r), \tag{10}$$

получаем дифференциальное неравенство (8). Лемма 2 доказана.

Лемма 3. *Пусть $f : \mathbb{B} \to \mathbb{B}$ — регулярный гомеоморфизм класса Соболева $W^{1,1}_{\mathrm{loc}}$, обладающий N-свойством. Тогда при $p = 2$ имеет место оценка*

$$S(r_1) \leqslant S(r_2) \exp\left\{-4\pi \int\limits_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{\delta_2(r)}\right\}, \tag{11}$$

а при $p > 2$ —

$$S^{\frac{2-p}{2}}(r_1) - S^{\frac{2-p}{2}}(r_2) \leqslant (4\pi)^{\frac{p}{2}} \frac{p-2}{2} \int\limits_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{\delta_p(r)}, \tag{12}$$

где $0 < r_1 \leqslant r_2 < 1$ и $\delta_p(r)$ определено равенством (2).

Доказательство. Воспользуемся дифференциальным неравенством (8). Тогда для п.в. $r \in [0,1]$

$$\frac{S'(r)}{S^{\frac{p}{2}}(r)}\, dr \geqslant (4\pi)^{\frac{p}{2}} \frac{dr}{\delta_p(r)}. \tag{13}$$

При $p = 2$, имеем

$$\frac{S'(r)}{S(r)}\, dr \geqslant 4\pi\, \frac{dr}{\delta_2(r)}. \tag{14}$$

Интегрируя обе части последнего неравенства по $r \in [r_1, r_2]$, получаем

$$\int\limits_{r_1}^{r_2} \left(\ln S(r)\right)'\, dr \geqslant 4\pi \int\limits_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{\delta_2(r)}. \tag{15}$$

Заметим, что функция $g(r) = \ln S(r)$ является неубывающей, тогда

$$\int\limits_{r_1}^{r_2} (\ln S(r))' dr = \int\limits_{r_1}^{r_2} g'(r) dr \leqslant g(r_2) - g(r_1) = \ln \frac{S(r_2)}{S(r_1)} \tag{16}$$

(см., напр., теорему IV. 7.4 в [6]) и

$$\ln \frac{S(r_2)}{S(r_1)} \geqslant 4\pi \int\limits_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{\delta_2(r)}, \tag{17}$$

откуда

$$S(r_1) \leqslant S(r_2) \exp\left\{-4\pi \int\limits_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{\delta_2(r)}\right\}. \tag{18}$$

При $p > 2$, имеем

$$\int\limits_{r_1}^{r_2} \left(\frac{S^{\frac{2-p}{2}}(r)}{\frac{2-p}{2}}\right)' dr \geqslant (4\pi)^{\frac{p}{2}} \int\limits_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{\delta_p(r)}. \tag{19}$$

Заметим, что функция $g_p(r) = \frac{S^{\frac{2-p}{2}}(r)}{\frac{2-p}{2}}$ является неубывающей, тогда

$$\int\limits_{r_1}^{r_2} \left(\frac{S^{\frac{2-p}{2}}(r)}{\frac{2-p}{2}}\right)' dr = \int\limits_{r_1}^{r_2} g_p'(r) \leqslant g_p(r_2) - g_p(r_1) = \frac{2}{2-p}\left(S^{\frac{2-p}{2}}(r_2) - S^{\frac{2-p}{2}}(r_1)\right) \tag{20}$$

(см., теорему IV. 7.4 в [6]).

Таким образом, получаем

$$S^{\frac{2-p}{2}}(r_1) - S^{\frac{2-p}{2}}(r_2) \leqslant (4\pi)^{\frac{p}{2}} \frac{p-2}{2} \int\limits_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{\delta_p(r)}. \tag{21}$$

Лемма 3 доказана.

3. Основные результаты.

Ниже приведена теорема об оценке площади образа круга.

Теорема 1. *Пусть $f : \mathbb{B} \to \mathbb{B}$ — регулярный гомеоморфизм класса Соболева $W^{1,1}_{\mathrm{loc}}$, обладающий N-свойством. Тогда при $p = 2$ имеет место оценка*

$$|f(B_r)| \leqslant \pi \exp\left\{-4\pi \int\limits_{r}^{1} \frac{dt}{\delta_2(t)}\right\}, \tag{22}$$

а при $p > 2$ —

$$|f(B_r)| \leqslant \pi \left(1 + (2\pi)^{p-1}(p-2) \int\limits_{r}^{1} \frac{dt}{\delta_p(t)}\right)^{-\frac{2}{p-2}}, \tag{23}$$

где

$$\delta_p(r)=\left(\int\limits_{\gamma_r} D_p^{\frac{1}{p-1}}(z)\,|dz|\right)^{p-1},\quad \gamma_r=\{z\in\mathbb{C}:|z|=r\}.$$

Доказательство. Теорема 1 следует из леммы 3 при условии, что $S(1)\leqslant|f(\mathbb{B})|=\pi$.

Из теоремы 1 вытекает аналог известной леммы Икома-Шварца (см. теорему 2 в [2]).

Теорема 2. *Пусть $f:\mathbb{B}\to\mathbb{B}$ — регулярный гомеоморфизм класса Соболева $W^{1,1}_{\rm loc}$, обладающий N-свойством, $f(0)=0$. Тогда при $p=2$ имеет место оценка*

$$\liminf_{z\to 0}|f(z)|\exp\left\{2\pi\int\limits_{|z|}^{1}\frac{dt}{\delta_2(t)}\right\}\leqslant 1, \tag{24}$$

а при $p>2$ —

$$\liminf_{z\to 0}|f(z)|\left(1+(2\pi)^{p-1}(p-2)\int\limits_{|z|}^{1}\frac{dt}{\delta_p(t)}\right)^{\frac{1}{p-2}}\leqslant 1. \tag{25}$$

Доказательство. Положим $l_f(r)=\min\limits_{|z|=r}|f(z)|$. Тогда, учитывая, что $f(0)=0$, получаем $\pi\, l_f^2(r)\leqslant|f(B_r)|$ и, следовательно,

$$l_f(r)\leqslant\sqrt{\frac{|f(B_r)|}{\pi}}. \tag{26}$$

Таким образом, учитывая неравенства (22) и (23), имеем

$$\liminf_{z\to 0}\frac{|f(z)|}{\mathcal{R}_p(|z|)}=\liminf_{r\to 0}\frac{l_f(r)}{\mathcal{R}_p(r)}\leqslant\liminf_{r\to 0}\sqrt{\frac{|f(B_r)|}{\pi}}\cdot\frac{1}{\mathcal{R}_p(r)}\leqslant 1,$$

где

$$\mathcal{R}_p(r)=\left(1+(2\pi)^{p-1}(p-2)\int\limits_{r}^{1}\frac{dt}{\delta_p(t)}\right)^{-\frac{1}{p-2}}$$

при $p>2$ и

$$\mathcal{R}_p(r)=\exp\left\{-2\pi\int\limits_{r}^{1}\frac{dt}{\delta_2(t)}\right\}$$

при $p=2$. Теорема 2 доказана.

Следствие 1. Пусть $f:\mathbb{B}\to\mathbb{B}$ — регулярный гомеоморфизм класса Соболева $W^{1,1}_{\rm loc}$, обладающий N-свойством, $f(0)=0$. Тогда при $p>2$ имеет место оценка

$$\liminf_{z\to 0}|f(z)|\left(\int\limits_{|z|}^{1}\frac{dt}{\delta_p(t)}\right)^{\frac{1}{p-2}}\leqslant(2\pi)^{1-p}(p-2)^{\frac{1}{2-p}}.$$

Список литературы

[1] *Bojarski B., Gutlyanskii V., Martio O., Ryazanov V.* Infinitesimal Geometry of Quasiconformal and Bi-Lipschitz Mappings in the Plane. – Tracts in Mathematics 19, Warsaw - Donetsk - Helsinki, 2013, 216 p.

[2] *Ikoma K.* On the distortion and correspondence under quasiconformal mappings in space // Nagoya Math. J. – 1965. – V. 25. – P. 175 – 203.

[3] *Лаврентьев М. А.* Вариационный метод в краевых задачах для систем уравнений эллиптического типа. – М., 1962, 136 с.

[4] *Lehto O., Virtanen K.* Quasiconformal Mappings in the Plane. – Springer–Verlag, New York, 1973, 258 p.

[5] *Ломако Т. В., Салимов Р. Р.* К теории экстремальных задач // Збірник праць Інституту математики НАНУ. – 2010. – Т. 7, № 2. – С. 264 – 269.

[6] *Сакс С.* Теория интеграла. — М.: ИЛ, 1949, 495 с.

[7] *Салимов Р. Р.* Нижние оценки p-модуля и отображения класса Соболева // Алгебра и анализ. – 2014. – Т. 26, № 6. – С. 143 – 171.

Виктория Викторовна Билет
Институт прикладной математики и механики НАН Украины
ул. Генерала Батюка, 19,
г. Славянск, Украина, 84116,
e-mail: biletvictoriya@mail.ru;

Руслан Радикович Салимов
Институт математики НАН Украины
ул. Терещенковская, 3,
г. Киев-4, Украина, 01004,
e-mail: ruslan623@yandex.ru